

( الأسئلة في 9 صفحات )

الزمن : ساعتان و 45 دقيقة

الصف الحادي عشر علمي

العام الدراسي 2014 / 2015 م

- المجال الدراسي الرياضيات -

امتحان نهاية الفترة الدراسية ا

القسم الأول - أسئلة المقال

السؤال الأول : (13 درجة)

(7 درجات) (a) أوجد مجموعة حل المعادلة :  $2(x-4)^{\frac{2}{5}} - 8 = 0$ 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(6 درجات) (b) أوجد مجال الدالة  $f$  :  $f(x) = \frac{\sqrt{3+x}}{2x+6}$ 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





ال الثالث : ( 12 درجة )

( a ) أوجد مجموعة حل المعادلة :

( 6 درجات )

$$\log ( 2x ) + \log ( x - 3 ) = \log 8 \quad , \quad x \in ( 3 , \infty )$$

( b ) أوجد قياس الزاوية المحددة بالمتجهين :  $\vec{A} = \langle 6 , 3 \rangle$  ,  $\vec{B} = \langle 3 , -1 \rangle$  ( 6 درجات )

ال رابع : ( 13 ءرءة )

( a ) أوءء مءموءة حل المعاءلة الءالفة باءءءءام الأصفار النسبفة الممكئة

( 8 ءرءات )

$$x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$$

السؤال الرابع :

( b ) فى اءء الإمتحانات نال أءء الطلاب ءرءة 16 من 20 فى مائة الرياضيات ءىء ( 5 ءرءات )

المتوسط الءسابى 13 و الانءراف المعيارى 5 و نال ءرءة 16 من 20 فى مائة

الفىزاء ءىء المتوسط الءسابى 14 و الانءراف المعيارى 4 ،

ما الءىمة المعيارىة للءرءة 16 مقارنة مع ءرءات كل مائة ؟ أىهما أفضل ؟

ثانيا: البنود الموضوعية

- أولاً: في البنود من (1) إلى (3) عبارات ظلل (a) إذا كانت العبارة صحيحة  
(b) إذا كانت العبارة خاطئة .

(1) إذا كانت  $f(x) = x + 1$  ,  $g(x) = x - 1$  فإن الدالتين كل منهما معكوس للأخرى

(2) سلوك نهاية الدالة :  $g(x) = -x^3 + 5x$  هو  $(\nearrow, \searrow)$

(3) الدالة  $y = 3(2)^x$  تمثل تضاول أسياً

ثانياً: في البنود من (4) إلى (10) لكل بند أربع اختيارات واحد فقط صحيح ظلل في ورقة الإجابة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة .

(4) إذا كان  $x > 0$  فإن التعبير  $\frac{(24)^{\frac{1}{3}} \times x^{\frac{8}{3}}}{(3x^2)^{\frac{1}{3}}}$  يساوي :

- (a)  $\frac{1}{2}x^2$  (b)  $2x^2$  (c)  $\frac{2}{3}x$  (d)  $\frac{1}{3}x$

(5) الدالة  $y = 4x^2$  دالة زوجية إذا كان مجالها :

- (a)  $[-4, 4)$  (b)  $[-4, 2)$  (c)  $[-2, 2]$  (d)  $[0, \infty)$

(6) كثيرة الحدود  $y = (1 - x^2)^2 (x + 1)$  هي من الدرجة :

- (a) الثالثة      (b) الرابعة      (c) الخامسة      (d) السادسة

(7) حل المعادلة  $e^{x-1} = 5$  هو :

- (a)  $x = \ln 6$       (b)  $x = \ln 5$       (c)  $x = \ln 5 - 1$       (d)  $x = \ln 5 + 1$

(8) إذا كان  $\vec{L} = \langle \vec{AC} \rangle + 2 \langle \vec{AB} \rangle - \langle \vec{BC} \rangle$  فإن :

- (a)  $\vec{L} = \frac{1}{2} \langle \vec{AB} \rangle$       (b)  $\vec{L} = -\frac{1}{2} \langle \vec{AB} \rangle$   
(c)  $\vec{L} = 3 \langle \vec{AB} \rangle$       (d)  $\vec{L} = -3 \langle \vec{AB} \rangle$

(9) لتكن النقاط  $E(2, 4)$ ,  $F(-1, -5)$ ,  $G(x, y)$  في المستوى الإحداثي

إذا كان  $\langle \vec{EF} \rangle = \langle \vec{EG} \rangle$  فإن  $(x, y)$  يساوي :

- (a)  $(-1, -5)$       (b)  $(-5, -13)$       (c)  $(5, 13)$       (d)  $(1, 5)$

(10) إذا كان حجم العينة يساوي 100 وحجم المجتمع الإحصائي يساوي 2000 فإن

كسر المعاينة يساوي :

- (a) 0.3      (b) 0.5      (c) 0.05      (d) 0.02

" انتهت الأسئلة "